

# Kvantová fyzika, KFY/7KVAF

## ZS 2021/2022

### Téma 1: Vlnové funkce, vektorové prostory, lineární operátory

1. Které z následujících funkcí mohou být vlnovými funkcemi stacionárních stavů částice na intervalu  $x \in (-\infty, \infty)$ ?

- $\psi(x) = x$  for  $x \geq 0$  and  $\psi(x) = 0$  for  $x < 0$ ,
- $\psi(x) = x^2$ ,
- $\psi(x) = e^{-|x|}$ ,
- $\psi(x) = e^{-x}$ ,
- $\psi(x) = \cos x$ ,
- $\psi(x) = \sin |x|$ ,
- $\psi(x) = e^{-x^2}$ ,
- $\psi(x) = 1$  for  $-1 \leq x \leq 1$  and  $\psi(x) = 0$  for  $x < -1$  and  $x > 1$ ,
- $\psi(x) = x(a-x)$  for  $0 \leq x \leq a$  and  $\psi(x) = 0$  for  $x < 0$  and  $x > a$ .

2. Mohou následující vlnové funkce popisovat identický kvantový stav?

- $\psi(x)$  a  $c\psi(x)$ , kde  $c$  je reálná konstanta,
- $\psi(x)$  a  $e^{if(x)}\psi(x)$ , kde  $f(x)$  je reálná funkce.

3. Prověřte lineární závislost/nezávislost následujících vektorů (a-d) a funkcí (e-f)

- $\vec{a} = (3, 2, 7)$ ;  $\vec{b} = (1, 1, 1)$ ;  $\vec{c} = (2, 0, 3)$ ,
- $\vec{a} = (3, 2, 0)$ ;  $\vec{b} = (1, 1, 1)$ ;  $\vec{c} = (5, 4, 2)$ ,
- $\vec{a} = (1.5, 2)$  a  $\vec{b} = (2.5, 3)$  a jestliže dokážete nezávislost, použijte oba vektory pro vyjádření třetího vektoru  $\vec{x} = (4, 1)$  jako jejich lineární kombinaci,
- $\vec{a} = (3, 4, 5)$ ;  $\vec{b} = (-6, 7, 0)$ ;  $\vec{c} = (8, -9, 1)$  a použijte těchto vektorů pro vyjádření čtvrtého vektoru  $\vec{x} = (23, -19, 6)$ ,
- $\psi_1(x) = x^2$ ;  $\psi_2(x) = x$ ;  $\psi_3(x) = \frac{1}{x}$ ;  $\psi_4(x) = 1$ ,
- $\psi_1(x) = 1 + x$ ;  $\psi_2(x) = x + x^2$ ;  $\psi_3(x) = x^2 + x^3$ ;  $\psi_4(x) = x^3 + 1$ .

4. Ověřte, že následující operace splňují axiomy skalárního součinu

- $(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^N x_i y_i$  definované na  $\mathbb{R}^N$  pro všechna  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^N$ ,
- $(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^N x_i y_i^*$  definované na  $\mathbb{C}^N$  pro všechna  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{C}^N$ ,
- $\langle \psi, \varphi \rangle = \int_a^b \psi(x)\varphi(x)dx$  pro všechny funkce  $\psi(x), \varphi(x) \in L^{\mathbb{R}}(a, b)$ ,
- $\langle \psi, \varphi \rangle = \int_a^b \psi^*(x)\varphi(x)dx$  pro všechny funkce  $\psi(x), \varphi(x) \in L^{\mathbb{C}}(a, b)$ .

5. Ověřte ortogonalitu systémů funkcí v Hilbertově prostoru  $L_2$

- $\{e^{inx}\}_{n=-\infty}^{\infty}$  v intervalu  $[0, 2\pi]$ ,
- $\{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots\}$  v intervalu  $(-\pi, \pi)$ ,
- Legendreovy polynomy na intervalu  $(-1, 1)$ , které jsou dány jako  $L_0(x) = 1$ ,  $L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$  (pokuste se vyjádřit první čtyři členy a ověřit vybrané kombinace).

6. Nahraďte vyjádření veličin klasické mechaniky jejich odpovídajícími kvantově-mechanickými operátory

- kinetická energie  $T = \frac{1}{2}mv^2$  v trojrozměrném prostoru,
- $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ , trojdimenzionální kartézský vektor,
- $y$ -složka momentu hybnosti  $L_y = zp_x - xp_z$ .

7. Vypočtěte

- $(\hat{A} - \hat{B})(\hat{A} + \hat{B})$ ,
- $\hat{A}^2$  odpovídající operátoru  $\hat{A} = \frac{d}{dx} + x$ ,
- $\hat{A}^3$  odpovídající operátoru  $\hat{A} = \frac{d}{dx} + \frac{1}{x}$ ,
- a porovnejte operátory  $(x \frac{d}{dx})^2$  and  $(\frac{d}{dx} x)^2$ .